

VACUNAS REQUERIDAS PARA EL INGRESO ESCOLAR, GRADOS K-12

Julio 1, 2011 – Junio 30, 2012

Todo tipo de documentación de vacunas recibidas debe incluir fecha con el Mes, día, y el año.

VACUNA	Kínder	1°-3° Grado	4°-5° Grado	6° Grado	7°-10° Grado	11°- 12° Grado
HEPATITIS B (Hep B) <ul style="list-style-type: none"> La 2ª dosis 4 semanas a partir de la 1ª dosis. La 3ª dosis 8 semanas a partir de la 2ª dosis. La 3ª dosis 16 semanas a partir de la 1ª dosis. La 3ª dosis a partir de los 6 meses de edad. 	Dosis Requeridas: 3 Son aceptables dos dosis de la vacuna para adolescentes (Recombivax HB®), <u>si</u> las dosis se dan entre los 11 y 15 años de edad <u>y</u> si las dosis son separadas por un mínimo de 4 meses.					
DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA (DTaP/DT/Td/Tdap) <ul style="list-style-type: none"> DTaP: para niños hasta los 6 años de edad. Td: para niños a partir de los 7 años de edad. Tdap: para niños a partir de los 11 años de edad. 	Dosis requeridas: 5, <u>y</u> si el niño recibió la 5ª dosis a partir de los 4 años. Son aceptables cuatro dosis de DTaP/DT, <u>si</u> el niño recibió la 4ª dosis a partir de los 4 años.	Dosis Requeridas: 5, <u>y</u> si el niño recibió la 5ª dosis a partir de los 4 años de edad. Dosis de vacunas aceptables: <ul style="list-style-type: none"> 4 dosis de vacuna DTaP/DT, <u>si</u> el niño recibió la 4ª dosis a partir de los 4 años. 3 dosis de cualquier otro tipo de vacuna contra la difteria y el tétano para completar la series en niños que tienen por lo menos 7 años de edad. Dosis requeridas de vacuna Tdap para estudiantes en el 6°–10° grado: 1, <u>y si</u> el estudiante tiene por lo menos 11 años de edad.				
POLIO (IPV u OPV) <ul style="list-style-type: none"> No es necesaria para estudiantes mayores de 18 años de edad. 	Dosis Requeridas: 4, <u>si</u> el niño recibió la 4ª dosis a partir de los 4 años de edad <u>y</u> si la 3ª y 4ª dosis son separadas por un mínimo de 6 meses. * Dosis aceptables: <ul style="list-style-type: none"> 4 dosis antes de los 4 años de edad <u>si</u> el niño recibió todas las dosis antes de la fecha 8/7/2009. * 3 dosis, <u>si</u> el niño recibió la última dosis a partir de o a los 4 años de edad. * 	Dosis requeridas: 4, <u>si</u> el niño recibió la serie completa antes de los 4 años. Dosis aceptables: 3, <u>si</u> el niño recibió la última dosis a partir de los 4 años.				
SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAPERAS Tripe Viral–SRP (MMR o MMRV).	Dosis requeridas: 2, <u>si</u> el niño recibió la 1ª dosis a partir del primer año de edad <u>y</u> la 2ª dosis por lo menos 28 días después (<u>Aplica</u> un periodo de gracia de 4 días entre dosis de vacunas virales atenuadas del mismo tipo como MMR/MMR o MMRV/MMRV).					
VARICELA (VAR o MMRV) <ul style="list-style-type: none"> La vacuna contra la varicela debe darse el mismo día que la vacuna MMR <u>o</u> deberán separarse por un mínimo de 28 días (<u>NO</u> aplica el periodo de gracia de 4 días entre dosis). 	Dosis requeridas: 2 El niño debe de recibir la 1ª dosis a partir del primer año de edad <u>y</u> la 2ª dosis por lo menos 3 meses después. Aceptable: <ul style="list-style-type: none"> Su proveedor de salud deberá verificar que el niño padeció de la enfermedad. Aplica un intervalo mínimo de 28 días entre dosis. 	Dosis requeridas: 1 El niño debe de obtener la 1ª dosis a partir del primer año de edad. Aceptable: Nota de los padres de familia de que el niño padeció de la enfermedad.	Recomendada pero no requerida.			

*Las recomendaciones nacionales de vacunación con fecha actualizada del 8/7/09 requieren la 4ª dosis a partir de los 4 años. Los niños que recibieron la 3ª o 4ª dosis antes de 8/7/09 no necesitan una dosis adicional.

- Es aceptable para todo tipo de vacuna:** un examen de sangre que demuestre inmunidad – con firma del proveedor de salud y copias del reporte de laboratorio.
- Se consideran validas:** las dosis de vacunas recibidas en un promedio de hasta 4 días antes de la edad mínima o intervalo (Periodo de gracia de 4 días).
- Aplica** el periodo de gracia de 4 días entre la 1ª y 2ª dosis de vacunas virales atenuadas sólo si son del mismo tipo, como por ejemplo MMR y MMRV, **pero no** MMR y MMRV.
- NO** aplica el periodo de gracia de 4 días entre la 1ª y 2ª dosis de vacunas virales atenuadas de diferente tipo como MMR y Varicela ó entre MMR e influenza atenuada.

Edad e intervalos mínimos para que las dosis de vacunas sean validas

Vacuna	# de Dosis	Edad Mínima	Intervalo Mínimo Entre Dosis	Notas
Hepatitis B <i>Hep B</i>	1ª Dosis	Nacimiento	4 semanas entre la 1ª y 2ª dosis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El intervalo mínimo para dosis de la vacuna Recombivax HB® es por lo menos de 4 meses. ▪ Complete la serie de vacunas dentro de los primeros 9 meses de haber comenzado la escuela. ▪ NO complete la serie de vacunas en menos de 4 meses.
	2ª Dosis	4 semanas	8 semanas entre la 2ª y 3ª dosis	
	3ª Dosis	24 semanas	16 semanas entre la 1ª y 3ª dosis	
Difteria, Tétanos y Tos ferina <i>DTaP/DT</i>	1ª Dosis	6 semanas	4 semanas entre la 1ª y 2ª dosis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El calendario de vacunación generalmente es de: 2, 4, 6, y de 15-18 meses de edad. Si el niño recibió la 4ª dosis antes de los 4 años, el niño tendrá que recibir la 5ª dosis entre los 4-6 años de edad. La 5ª dosis no es necesaria si el niño recibió la 4ª dosis a partir de los 4 años edad. ▪ Se recomienda 6 meses entre la 3ª y 4ª dosis, pero un intervalo de por lo menos 4 meses es aceptable.
	2ª Dosis	10 semanas	4 semanas entre la 2ª y 3ª dosis	
	3ª Dosis	14 semanas	6 meses entre la 3ª y 4ª dosis	
	4ª Dosis	12 meses	6 meses entre la 4ª y 5ª dosis	
	5ª Dosis	4 años	–	
Tétanos, Difteria y Tos ferina <i>Tdap</i>	1ª Dosis	10 años (La edad mínima para recibir la vacuna Tdap depende de la marca de la vacuna)	–	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Boostrix®: está autorizada para personas de 10 años de edad. ▪ Adacel®: está autorizada para personas de 11 años de edad.
Tétanos y Difteria <i>Td</i>	1ª Dosis	7 años	5 años	
Polio <i>IPV u OPV</i>	1ª Dosis	6 semanas	4 semanas entre la 1ª y 2ª dosis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los niños que recibieron la 4ª dosis después de la fecha 8/7/09 (cambio en las recomendaciones de vacunación nacionales) deben recibir la 4ª dosis a partir de o a los 4 años. Las 3ª y 4ª dosis deben ser separadas por un mínimo de 6 meses.
	2ª Dosis	10 semanas	4 semanas entre la 2ª y 3ª dosis	
	3ª Dosis	14 semanas	6 meses entre la 3ª y 4ª dosis	
	4ª Dosis	4 años	–	
Sarampión, Rubéola y Paperas (Tripe Viral– <i>SRP</i>) <i>MMR o MMRV</i>	1ª Dosis	12 meses	4 semanas entre la 1ª y 2ª dosis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>MMRV (MMR + Varicela)</i> puede utilizarse en lugar de las vacunas <i>MMR</i> y <i>Varicela</i> por separado. ▪ El niño debe obtener dosis de las vacunas <i>MMR</i>, <i>Varicela</i>, <i>MMRV</i> y cualquier otra vacuna viral atenuada, el mismo día. De no ser posible, las vacunas deberán espaciarse por un mínimo de 28 días. ▪ Aplica el periodo de gracia de 4 días entre las 2 dosis de vacuna <i>MMR</i> siempre y cuando el niño no reciba una vacuna contra la <i>varicela</i> o <i>MMRV</i> el mismo día.
	2ª Dosis	13 meses	–	
Varicela <i>VAR</i>	1ª Dosis	12 meses	3 meses entre la 1ª y 2ª dosis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El niño debe recibir dosis de las vacunas <i>MMR</i> y <i>Varicela</i> el mismo día o las vacunas deberán espaciarse por un mínimo de 28 días. ▪ Se recomienda 3 meses entre dosis de varicela para niños a partir de los 13 años de edad. Se acepta un intervalo mínimo de 28 días.
	2ª Dosis	15 meses	–	

Para información sobre otras vacunas no recomendadas para la admisión escolar, le invitamos a ver el esquema completo de vacunación: <http://www.immunize.org/cdc/schedules/>

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (1-800-833-6388 relevador TTY).